

Esperal

Czy decydować się na esperal? Disulfiram (esperal, anticol) nie leczy uzależnienia od alkoholu, natomiast poprzez "uczulenie" na alkohol może powstrzymywać od picia oraz ułatwić podjęcie terapii. Reakcja disulfiram - alkohol rozpoczyna się zwykle po upływie 5 - 15 min. od spożycia alkoholu i jest spowodowana nadmiernym gromadzeniem się aldehydu octowego, który jest trucizną ok. 30 razy silniejszą niż sam alkohol etylowy. Osoby, które zdecydowały się na podjęcie ryzyka jakim jest "wszycie" disulfiramu powinny być pod stałą opieką specjalistyczną, a jednocześnie systematycznie uczestniczyć w programie terapii uzależnienia. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z możliwością przeoczenia powikłań, które mogą wystąpić po zastosowaniu tego preparatu, zaś po okresie abstynencji wymuszonej strachem przed reakcją disulfiram - alkohol, najczęściej następuje powrót do picia alkoholu, a dalszy przebieg choroby okazuje się często znacznie bardziej groźny niż przed "wszyciem". Zanim zdecydujesz się na "wszycie" przyjdź do nas na konsultację. Jeżeli już masz "wszycie" esperal - przyjdź także, podpowiemy co robić dalej, żeby alkohol przestał być dla Ciebie problemem po okresie działania esperalu.